INSTRUÇÃO DE USO

HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL TEEM ABIMADE

FABRICADO por: ABIMADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICOS LTDA.

Rua Avencas, nº 48– Recanto Sombra do Ypê - Santana de Parnaíba - SP
CEP: 06513-212 - Tel/Fax.: (0xx11) 4622-7555
C.N.P.J./M.F.: 07.607.291/0001-20-Ins. E st 623.103.957.117
Registro ANVISA nº: 80525320003

3. INSTRUÇÕES DE USO:

3.1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

A Haste Intramedular Flexível Teem - Abimade, sem bloqueio é fabricada em Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) ELI, de acordo com a norma ASTM F 136 / NBR ISO 5832-3, para fixação óssea do fêmur com variações das dimensões que permite ao profissional escolher o modelo mais adequado a cada situação, as hastes apreseta-se com 100 mm de comprimento, nos diâmetros de 1.0 mm, 1.2 mm e 1.4 mm (MINI) e com 450 mm de comprimento, nos diâmetros de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm e 5.0 mm, são embaladas em embalagem plástica (polietileno), ou em embalagem de duplo blister de PET com 5 unidades, lacrada com papel grau cirúrgico + caixa de papel cartão, ou em conjunto na forma coletiva (caixa + bandeja de plástico), acondicionadas em caixa de papelão, em condições não estéreis e de uso único, mantidas em suas embalagens até o momento de colocação na sala cirúrgica, devidamente identificadas.

As hastes são apresentadas como opção mais simples para fraturas diafisárias e metafisárias em substituição das placas. O processo operatório é mini invasivo e os implantes facilmente adaptáveis à situação da cirurgia. A flexibilidade do titânio permite o “efeito de mola” entre os implantes, garantindo estabilidade, diminuição do tempo de cirurgia e reabilitação do paciente.

As hastes deverão ser higienizadas e esterilizadas, antes de seu uso, de acordo com métodos explicados nas instruções de uso.

Os avanços tecnológicos têm proporcionando ao cirurgião ortopedista restabelecer a mobilidade e reduzir a dor em muitos pacientes. Ainda que a haste intramedular tenha alta porcentagem de êxito, não se pode esperar que ela suporte os níveis e as cargas dos ossos saudios e normais.

Só deve ser submetido à atividade cirúrgica de implante desse produto, após criterioso diagnóstico médico de adequação aos detalhes da técnica cirúrgica correspondente.

3.1.1. TABELA DE CÓDIGOS, TAMANHOS, DIMENSÕES, ASSOCIANDO A DESCRIÇÃO DE CADA MODELO DO PRODUTO:

- Produto Acabado:** Haste Intramedular Flexível Teem -Abimade.
- Composição Química:** Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) (ASTM F 136 / NBR ISO 5832-3).

Código	Cor	Descrição / Diâmetro / Comprimento
010-00	Amarela	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.0 x 100 mm
012-00	Azul	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.2 x 100 mm
014-00	Vermelha	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.4 x 100 mm
015-00	Dourada	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 1.5 x 450 mm
020-00	Verde	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 2.0 x 450 mm
025-00	Vermelha	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 2.5 x 450 mm
030-00	Amarela	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 3.0 x 450 mm
035-00	Azul	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 3.5 x 450 mm
040-00	Violeta	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 4.0 x 450 mm
045-00	Cinza	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 4.5 x 450 mm
050-00	Cinza Escuro	Haste Intramedular Flexível Teem Ø 5.0 x 450 mm

3.1.2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

As Hastes Intramedulares Flexíveis, sem bloqueio são fornecidas não estéreis onde, as hastes apreseta-se com 100 mm de comprimento, nos diâmetros de 1.0 mm, 1.2 mm e 1.4 mm (MINI) e com 450 mm de comprimento, nos diâmetros de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm e 5.0 mm, são embaladas em embalagem plástica (polietileno), ou em embalagem de duplo blister de PET com 5 unidades, lacrada com papel grau cirúrgico + caixa de papel cartão, ou em conjunto na forma coletiva (caixa + bandeja de plástico), acondicionadas em caixa de papelão, em condições não estéreis e de uso único, mantidas em suas embalagens até o momento de colocação na sala cirúrgica, devidamente identificadas.

3.1.3. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO / MANIPULAÇÃO:

Os implantes são extremamente sensíveis a danos. Mesmo pequenas crateras ou marcas de batida podem criar uma tensão interna que reduz extremamente a resistência. Por este motivo, um manuseio extremamente cuidadoso é indicado.

- Armazenar os implantes na sua embalagem original, em lugar seco e limpo em temperatura entre 15C e 35C. Tomar cuidado especial para que produtos químicos não se encontrem na proximidade imediata.
- O produto estará acondicionado em embalagem do tipo berço e blister, etiquetado. A embalagem não deve ser violada. Deve ser mantido em sua embalagem original até colocação na caixa cirúrgica.
- Para seleção e implantação devem ser utilizados exclusivamente os instrumentos cirúrgicos específicos.
- Os implantes não podem ser rotulados nem entrar em contato com objetos metálicos ou outras superfícies duras (por ex., tampo da mesa). Entretanto, se este for o caso, estes componentes não devem ser implantados. Eles devem ser devolvidos ao fornecedor para controle.
- Os implantes não devem ser mecanicamente trabalhados nem modificados de alguma outra maneira, o que deve ser expressamente observado pela Construção e pela Técnica Cirúrgica. Em caso de dúvida, deve ser solicitada uma autorização, por escrito, do fabricante.
- Em nenhum caso podem ser implantados os implantes aparentemente danificados, riscados, imprópriamente manuseados ou transformados sem autorização. Assim como os implantes que já foram uma vez utilizados.
- Os implantes são embalados, transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado em local

seco e não devem ser deixadas à ação de umepéries, em prateleiras identificadas, respeitando o empilhamento que é no máximo 10 (dez) caixas, e respeitando o sistema *PEPS* (primeiro que entra é o primeiro que sai).

- O armazenamento do produto nas prateleiras deve ser de tal maneira que facilite a visualização do operador.
- Todas as embalagens são identificadas com etiquetas que informam código do produto, número do registro do produto na ANVISA, lote, responsável técnico e dados da empresa.
- A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas na área médico-hospitalar.

3.1.4. INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO E INDICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO:

Realize um pequeno acesso lateral e medial fazendo um pequeno orifício com o punção e iniciando a introdução das Hastes utilizando um mandril perfurado e controlando a sua direção com videoscopia até a introdução da haste com a ponta chanfrada em direção ao lado oposto da implantação até a fixação da ponta chanfrada na cortical óssea, evitando assim sua migração.

Após a introdução da primeira haste, uma segunda haste de mesmo diâmetro é recomendável com a introdução em lado oposto a primeira, e com procedimento semelhante.

Após a introdução das hastes são cortadas no comprimento adequado podendo ou não deixar uma ponta de 5 a 7 milímetros fora do osso para a facilitação da retirada, após a consolidação óssea.

Sua fixação é feita pelo formato da ponta tipo bala e pela sua flexibilidade dando um efeito de mola que fixa a haste e mantém a fratura estável.

Uma fixação externa pode ser utilizada dependendo do grau de estabilidade conseguida durante a implantação das hastes.

Controle Pré-Operatório.

Antes da utilização das hastes, estas devem ser testadas quanto à mudança de cor, riscos, ranhuras e outros defeitos que podem ser provocados por armazenagem e esterilização inadequados.

De importância primordial é a escolha correta dos componentes do implante. O tipo correspondente do implante assim como o seu tamanho deve ser ajustado para cada paciente individual.

A utilização do implante máximo possível e o seu posicionamento correto previnem uma contra flexão, quebra e afrouxamento do implante. Somente implantes de um mesmo sistema e de mesmo material podem ser usados conjuntamente.

Os implantes não podem entrar em contato com objetos que podem danificar a sua superfície. Eles não podem ser trabalhados mecanicamente ou modificados de alguma outra maneira. Isto deve ser expressamente observado pela construção e pela técnica cirúrgica.

Controle Pós-Operatório.

As instruções pós-operatórias aos pacientes assim como uma enfermagem correta, são de máxima importância, uma carga de peso prematura aumenta a solicitação do implante, podendo levar a quebra, deformação ou afrouxamento. Uma carga prematura pode ser considerada quando estivermos diante de uma fratura estável com um bom contato osso-osso.

A decisão final para a remoção do implante cabe ao cirurgião. Os implantes devem ser removidos quando não forem mais necessários como auxiliares da cura e, este passo deve ser possível e prático para o paciente.

Indicação de Capacitação:

A implantação da Haste Intramedular Flexível Teem deve ser realizada somente por profissionais habilitados e capacitados em procedimentos de fixação óssea. Devem estar asseguradas as condições para que ocorra cirurgia altamente asséptica e que todos os compostos não-implantáveis (instrumentais), estejam disponíveis antes do uso. A avaliação clínica e radiológica pré-operatória do paciente deve ser conclusiva.

IMPORTANTE:

A imobilização externa somente será realizada se o médico diagnosticar a necessidade de uma estabilidade maior ao implante, sendo esta fixação realizada por tala, e utilizando técnica comum de imobilização de fratura.

3.1.4.1. ESCLARECIMENTO SOBRE INDICAÇÃO DE USO DOS MODELOS DA HASTE:

Segue abaixo a tabela a qual esclarece a indicação de uso dos modelos de haste intramedular, seguindo os critérios para agrupamento em famílias de haste de fixação intramedular, são especificações da família das Hastes Intramedulares Flexíveis Teem quanto à:

Rigidez associada à Estrutura	É usada a forma de estrutura flexível , que permite que haja flexibilidade da haste ao tipo de fratura no momento da implantação.
Forma de Fixação	É usada a forma de fixação sem bloqueio , que permite a implantação sem parafusos ou pinos.
Forma de Bloqueio	Não Aplicável.
Aplicação (apenas para sistemas)	Sua aplicação é indicada para fraturas diafisárias e metafisárias.

São indicadas para os seguintes tipos de fraturas:

- Fraturas Transversais.**
- Fraturas Transversais ou Obliquas pequenas com extremidade quebradas.**
- Fraturas Obliquas pequenas com possibilidade de suporte cortical.**
- Fraturas Espirais.**
- Fraturas Bifocais e Multi-fragmentares.**
- Fraturas Patológicas com cistos ósseos juvenis.**

São indicadas para os seguintes locais:

- Fêmur: diafisária.**
- Fêmur distal: metafisária.**
- Fêmur: subtrocantariana.**
- Perna inferior: diafisária.**
- Perna inferior: metafisária distal.**
- Úmero: diafisária e subcapital.**
- Úmero: supracondilar.**
- Rádio e Ulna: eixo.**
- Rádio: pescoço.**

OBS: O seu **uso não será recomendado** para qualquer outro tipo de fratura se não as recomendadas acima.

Este esclarecimento acima segue a **Parte 6 do Anexo II da Instrução Normativa nº 1** de 2 de Março de 2009 que *“Estabelece os critérios específicos para o agrupamento em famílias e sistemas de IMPLANTES ORTOPÉDICOS para fins de registro”* e a **Parte 3** (Família de Implantes para Ortopedia) da **Resolução nº 59/2008** que *“Institui o Regulamento Técnico com os requisitos gerais para o agrupamento em famílias e sistemas de IMPLANTES ORTOPÉDICOS para fins de registro”*.

3.1.5. PRECAUÇÕES DE USO / ADVERTÊNCIAS / RESTRIÇÕES DE USO / CUIDADOS ESPECIAIS:

Precauções de Uso:

O cirurgião deve estar ciente do seguinte ao utilizar um implante:

- A seleção correta do implante é extremamente importante. A possibilidade de êxito aumenta com a seleção do tamanho, forma e desenho adequados do implante. O tamanho e a forma dos ossos humanos apresentam restrições limitadoras para o tamanho e a resistência dos implantes. Não se pode esperar que algum implante resista facilmente às tensões não suportadas exercidas por um peso total.
- A manipulação correta do implante é extremamente importante. Os componentes do implante não devem ser dobrados, ranhurados ou riscados. Estas operações podem produzir defeitos no acabamento das superfícies e nas concentrações de tensões internas, que poderão tornar-se o ponto focal de falhas eventuais do dispositivo.
- Para utilização uma única vez. **Os implantes cirúrgicos não devem ser reutilizados. Qualquer implante utilizado uma vez deve ser descartado.** Mesmo que o dispositivo possa parecer não danificado, poderá apresentar já pequenos defeitos e padrões de tensão interna que podem levar a falha por fadiga do material.
- Não esterilizado: os implantes são fornecidos não esterilizados e, por isso, devem ser esterilizados antes de cada utilização.
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação do osso operado.
- Instruções adequadas ao paciente sobre os cuidados pós-operatórios devem ser indicados pelo cirurgião de acordo com o estilo de vida do paciente, características físicas e outras variáveis consideradas relevantes pelo médico.
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.
- Efetuar testes de compatibilidade dos biomateriais a serem utilizados na cirurgia.
- A presença de implantes metálicos pode comprometer a realizações de alguns tipos de exames ou procedimentos como, por exemplo, o exame Ressonância Magnética.
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Advertências:

Produto de Uso Médico, deve ser manuseado por profissionais especializados.

Uso Único - Proibido Reprocessar - Destruir Após o Uso.

Produto Não Estéril. Esterilizar dentro de caixa cirúrgica, antes da implantação em Auto Clave Hospitalar, de acordo com o procedimento padrão.

Todo implante, uma vez usado, tem que ser descartado. Inclusive quando não aparente estar danificado, já que pode ter pequenos defeitos e zonas de tensão internas que podem causar falhas do implante por fadiga.

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com devidos cuidados da área médico-hospitalar.

Restrições de Uso:

Os pacientes que tenham suporte ósseo inadequado.

Uso Único - nenhum implante deve ser utilizado novamente. Ainda que, aparentemente, estejam em perfeitas condições o implante poderá conter pequenas fissuras ou defeitos nas áreas de tensão interna, podendo levar à ruptura por fadiga. São recomendáveis que fossem utilizados somente implantes novos.

Desprezar o produto caso a embalagem esteja violada.

Apenas o cirurgião poderá decidir sobre a retirada do implante. Retorne todas as embalagens com falhas na barreira estéril ao fornecedor. Não Reesterilize.

Condições que sobrecarregam a extremidade afetada: obesidade, trabalho/esporte pesado, jovem, histórico de quedas, abuso de drogas e álcool e outras inabilidades.

Pacientes com sintomas sugestivos de infecção, histórica ou sinais assim como local inflamado, abscessos, febre, aumento da taxa de sedimentação do sangue, evidências de rápida destruição da articulação não devem ser tratados a menos que uma infecção pré-operatória seja eliminada.

Pacientes que possam vir a ignorar parte ou totalmente o correto pós-operatório (com problemas mentais, crianças, idosos, dependentes químicos, entre outros).

O médico ortopedista deverá instruir o paciente das limitações do seu implante e dos perigos das pressões excessivas exercidas pelo corpo sobre o implante, até que haja uma adequada consolidação do osso.

A haste intramedular deverá ser utilizada com cautela em fraturas longitudinais instáveis, em pacientes com menos de 5 anos de idade, e também em pacientes com mais de 50kg de peso corporal.

Cuidados Especiais:

Todos os instrumentos devem ser cuidadosamente examinados antes do uso, para garantir o correto estado de funcionamento. Se há a possibilidade de um dos componentes ou do instrumento apresentar defeito, dano, ou apresentar problema, **NÃO O UTILIZE.**

Cada cirurgião é responsável pela escolha dos tamanhos dos implantes a serem utilizadas nas cirurgias.

Os cuidados no planejamento pré-operatório e nos procedimentos cirúrgicos, incluindo o conhecimento da técnica cirúrgica, a seleção e a colocação apropriadas do implante, são considerações importantes na utilização bem sucedida deste dispositivo.

Devem ser fornecidas ao pacientes instruções detalhadas sobre o uso e as limitações deste dispositivo.

Procedimentos pré-operatórios e operatórios, incluindo domínio das técnicas cirúrgicas e seleção apropriada e posicionamento do implante são considerações importantes para o sucesso do procedimento cirúrgico.

A seleção apropriada do paciente, de acordo com sua capacidade de cumprir as instruções médicas e seguir o regime de tratamento prescrito, vão influenciar diretamente os resultados. É importante selecionar a melhor terapia levando-se em conta as habilidades físicas e/ou mentais e/ou possíveis limitações do paciente. Se o paciente exibir quaisquer contraindicações ou for predisposto a alguma contraindicação, **NÃO UTILIZAR** o implante.

Os implantes não devem ser reutilizados! Para assegurar um acompanhamento completo, os números de série e lote do artigo empregado devem constar do Relatório Cirúrgico.

Uma vez removido do paciente, o implante não deve ser reusado. Descarte todos os implantes danificados. AAbimade não aceita devolução deste tipo de material.

3.1.6. CONTRAINDICAÇÕES:

Estados de saúde que excluam um suporte suficiente aos implantes ou que retardem o processo de cura, por exemplo:

- Impedimento de transfusão de sangue.
- Quantidade ou qualidade insuficiente da massa óssea.
- Obesidade extrema.